

Acrodermatitis continua suppurativa (Hallopeau)

Szép Z., Kolibášová K.

Katedra dermatovenerológie SPAM, NsP Ružinov, Bratislava
vedúca katedry doc. MUDr. K. Kolibášová, PhD.

Choroba je zaradená medzi akropustulózy. Lokalizácia prejavov je v oblasti nechtových valov, subungválne a v úrovni distálnych falangov prstov rúk (nôh). Šírenie dermatózy je možné proximálnym smerom (obr. 2). Primárnou eflorescenciou sú sterilné pustuly, ktoré môžu splyvať (obr. 1). Kryt pustúl buď zasycha za vzniku psoriaziformných šupín, alebo pustuly erodujú s následnou tvorbou krust (obr. 2). Subungválne erupcie pustúl vedú k onycholýze a k obnaženiu ne-

chtového lôžka (obr. 3). V konečnom štádiu nastáva atrofia kože prstov a osteoporóza distálnych falangov.

Došlo do redakcie: 25. 4. 2000

MUDr. Zoltán Szép
Katedra dermatovenerológie
SPAM, NsP Ružinov
Ružinovská 6
826 06 Bratislava, SR



Obr. 1. ACS - splynuté pustuly na brušku prsta.



Obr. 2. ACS - erodované ložiská kryté krustami. Progresia proximálnym smerom.



Obr. 3. ACS - následok onycholýzy: obnaženie nechtového lôžka.