

## Erythema dyschromicum perstans (Ashy dermatitis)

**Szép Z., Kolibášová K.**

Katedra dermatovenerológie Slovenskej Postgraduálnej Akadémie Medicíny (SPAM), Bratislava  
vedúca katedry doc. MUDr. Klaudia Kolibášová, PhD.

Choroba zaradená medzi erytematózne dermatózy. Morfológicky makuly, rôznej veľkosti. Čerstvé prejavy červenkastej farby, okraje niekedy vyvýšené, periférne šírenie. Staršie morfy typickej popolavosivej - modrosivej farby. Prejavy solitárne alebo diseminované. Možnosť splývania do polycyklických ložísk. Lokalizácia na trupe (zriedka na tvári a končatinách). Usporiadanie v smeroch štiepiteľnosti kože, ale aj nepravidelne, asymetricky.

### LITERATÚRA

Kolibášová, K., Haid, J., Hlavatý, P.: Erythema dyschromicum perstans v materiáloch kožnej kliniky ILF. Čs. Derm. 65 (6), 1990, s. 379-381.

MUDr. Zoltán Szép  
Katedra dermatovenerológie SPAM  
NsP Ružinov, Ružinovská 6, 826 06 Bratislava, SR

Včasné štádium choroby



Obr. 1. Erythema dyschromicum perstans - čerstvé makulózne prejavy, červenkastej farby, typická lokalizácia na trupe, v smeroch štiepiteľnosti kože. Splývanie morf.



Obr. 2. Erythema dyschromicum perstans - detail ložísk.

Neskoršie štádium



Obr. 3. Erythema dyschromicum perstans - neskoršie štádium: typická popolavosivá farba, splývanie do polycyklických ložísk.



Obr. 4. Erythema dyschromicum perstans - detail ložísk typický popolavosivý kolorit