

## Prurigo nodularis (Hyde)

Szép Z., Kolibášová K.

Katedra dermatovenerológie SPAM, NsP Ružinov, Bratislava, SR  
vedúca katedry doc. MUDr. K. Kolibášová, PhD.



Obr. 1. Prurigo nodularis - typická predilekčná lokalizácia: prevažne na končatinách, ojedinele na trupe.



Obr. 2. Prurigo nodularis - v nepravidelných skupinách usporiadané uzly, od seba izolované.



Obr. 3. Prurigo nodularis - nad povrch kože prominujúce tuhé livídne uzly, na povrchu hemoragická krusta.

Choroba zaradená do skupiny pruriginózných dermatóz. Osobitná veľkopapulózna forma pruriga. Silný pruritus.

Morfologicky noduly. Lokalizácia na končatinách, zriedka na trupe.

Veľké hrbolovité, nad úroveň kože prominujúce tuhé uzly, v skupinkách, od seba izolovanými, s drsným povrchom, farby kože, fialovočervenej, niekedy sivej.

Sekundárne zmeny následkom pruritu: exkoriácie, erozie, niekedy hemoragické krusty na povrchu uzlov,

neskôr verukózne zmeny na povrchu nodúl. Okolitá koža bez zmien, neskôr ekzematizácia a lichenifikácia.

MUDr. Zoltán Szép  
Katedra dermatovenerológie SPAM  
NsP Ružinov, Ružinovská 6  
826 06 Bratislava  
SR